

أوتيل ديودو فرانس  
مركز طبي جامعي



الاستكشاف بالمنظار التنفسي

- ينصح بعدم قيادة سياراة خلال 6 ساعات بعد تنظير الشعب الهوائية. قد يحتاج المريض إلى شخص ليرافقه إلى منزله بعد التنظير
- يقام الفحص على الريق منذ منتصف الليل البارحة
- من المفضل توقيف جميع أدوية سيلان الدم قبل الفحص لمدة تختلف بحسب الدواء المستخدم:

Aspirine و Sintrom يجب أن يتم إيقافهما قبل 5 أيام  
Plavix و Clopidogrel يجب أن يتم إيقافهما قبل 7 أيام  
Pradaxa و Xarelto و Eliquis يجب أن يتم إيقافهما قبل يومين. ولكن، مرغوب برأي الطبيب المعالج.

- لديك حساسية على دواء؟ نعم؟ أخبر ممرضتك
- هل تتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم؟ نعم؟ يمكنك أن تتناولهم يوم التنظير مع جرعة ماء

احضر معك يوم التنظير كل نتائج الفحوصات التي سبق أن قمت بها للرتئين (سكانر الرتئين، PCR لفحص الكورونا، اختبارات الدم...)

- يجب على المريض أن يقوم بـ PCR لفحص الكورونا واختبار دم قبل يوم من التنظير
- التوقف عن الأكل والشرب لمدة ساعتين بعد التنظير

بعد تنظير الشعب الهوائية، ينصح بالبقاء في المنزل وعدم العمل في هذا اليوم.

إنّ **تنظير القصبات** المرن هو استكشاف بالمنظار التنفسي ينطوي على ادخال من خلال الأنف جهاز طويل وليّن اسمه منظار ولا يتخطى حجمه أكثر من سنتيمتر، يسمح بالفحص البصري للقصبات الهوائية. بالإضافة، يسمح هذا الاجراء بسلسلة من الاختبارات الإضافية بهدف بكتيريولوجي أو مناعي والعينات السيتوباثولوجية والخزعات بالإضافة الى الأعمال العلاجية مثل الكي بالليزر لتنظيف أصله من الاورام والخ.

عندما يكون التنظير مندمج مع الأشعة فوق الصوتية نتكلم عن **EBUS**. وهذا فحص يتطلب خبرة معيّنة. ويسمح بأخذ عينات من الدرن والتي تعتبر الأفضل لتقييم توسع كل أورام الشعب الهوائية. يسمح أيضًا بخزعة بعض الاورام المركزية التي يتعذر الوصول إليها في التنظيرات العادية.

يجرى الفحص تحت تخدير موضعي. يتضمن هذا التخدير: الأنف (ان دخل الجهاز عبر الأنف) أو الفم، الحلق، الأوتار الصوتية ومجرى الهواء.

مدّة الفحص حوالي 30 دقيقة.

إن مفعول التخدير في حال استعماله يدوم 6 ساعات.

خلال التخدير الموضعي، إنّ الغثيان والسعال أمرين طبيعيين. لذلك يجرى هذا الفحص على الريق منذ أربع ساعات على الأقلّ. إنّ الفحص غير مؤلم.

من السهل أن يسيطر البنج الموضعي على الغثيان والسعال. إنّ أجري خزعات خلال الفحص، يمكن أن يظهر بلغم مع دمّ في الساعات التابعة للإجراء.

ليس من غير المألوف أن تعلق الحرارة لتصل حتى 39° بعد 12 ساعة من الاجراء.

في معظم الأحيان، ليس إلتهاب ولا تتطلب الحرارة إلى اعطاء مضاد حيوي. ممكن اعطاء مانع للحمى (مثل Aspirine أو Paracetamol). ولكن، ان استمرّت الحرارة 24 ساعة بعد الاستعراض، الاستشارة الطبية أمر ضروري.

إذا أجري الفحص في العيادات الخارجية، المراقبة أمر ضروري بعد الفحص قبل السماح بالعودة الى المنزل.

**للاستفسار الرجاء التواصل على :**

**01-604 000 ext. 8661**



Université Saint-Joseph de Beyrouth  
جامعة القديس يوسف في بيروت

**أوتيل ديو دو فرانس**  
مركز طبيّ جامعيّ



**01 604 000**



[www.hdf.usj.edu.lb](http://www.hdf.usj.edu.lb)